


ပိုးသတ်ဆေးခါတ်ကြွင်းပါဝင်မှု မြင့်မားရသည့် အကြောင်းအရင်းများ

- ၁။ ပိုးသတ်ဆေးကို မလိုအပ်ဘဲ အသုံးပြုခြင်း။
- ၂။ ပိုးသတ်ဆေးကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုခြင်း။
- ၃။ အရည်အသွေးမပြည့်မီသော(တရားမဝင်)ပိုးသတ်ဆေးများ အသုံးပြုခြင်း။
- ၄။ လိုအပ်သောနှုန်းထားထက် ပိုမိုအသုံးပြုခြင်း။
- ၅။ ပိုးသတ်ဆေးပက်ဖျန်းသည့် အကြိမ်အရေအတွက် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုပက်ဖျန်းခြင်း။
- ၆။ ပိုးသတ်ဆေးပက်ဖျန်းရာတွင် ပျက်စီးနေသော ဆေးဖျန်းကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်း။
- ၇။ ပိုးသတ်ဆေး ပက်ဖျန်းပြီးချိန်မှ မရိတ်သိမ်းမီ အတွင်း စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလအားမစောင့်ဘဲ သီးနှံများအား ရိတ်သိမ်းခြင်း။
- ၈။ ပိုးသတ်ဆေးပက်ဖျန်းသည့်ပုံစံ မမှန်ကန်ခြင်း။
- ၉။ သုံးစွဲပြီး ပိုးသတ်ဆေးများကို စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်ခြင်း။

ဆေးဝယ်ယူရာတွင် သတိပြုရမည့် အချက်များ

- ၁။ ကျရောက်သောဖျက်ပိုးနှင့် ပက်ဖျန်းရမည့်ဆေးကိုက်ညီမှု ရှိအောင်ဝယ်ယူပါ။
- ၂။ မြန်မာအညွှန်းမပါ။ အညွှန်းဆုတ်ပြင်သော ပိုးသတ်ဆေးအား မဝယ်ပါနှင့်။
- ၃။ မူလအထုတ်၊ ပုလင်း၊ ဗူးအတိုင်း ဝယ်ပါ။



ဆေးဖျော်စပ်ရာတွင်သတိပြုလိုက်နာရမည့် အချက်များ

- ၁။ ပိုးသတ်ဆေးများကို ရောစပ်ရာတွင် ထောက်ခံထားသည့် ပြင်းအား၊ နှုန်းထားအတိုင်းရောစပ်ပါ။
- ၂။ အသုံးပြုမည့် ပမာဏထက်ပို၍ မဖျော်ရ။
- ၃။ ပိုးသတ်ဆေးအချင်းချင်းကို မိမိဘာသာရောစပ်ခြင်းမပြုရပါ။



ဇိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ဇိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မှ
ထုတ်ဝေထားသည့် ပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များအား
မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်က ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပါသည်။



ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဆေးဖျန်း ကိရိယာများစနစ်တကျ သုံးစွဲနည်းလမ်းများ




ဆေးဖျန်းရာတွင် သတိပြုလိုက်နာရမည့် အချက်များ

- ၁။ လေအောက်မှ ပိုးသတ်ဆေးမဖျန်းရပါ။
- ၂။ လေပြင်းထန်သောအချိန်တွင် ဆေးမဖျန်းသင့်ပါ။
- ၃။ နေပူ၍ အပူချိန်မြင့်မားချိန်တွင် ဆေးမဖျန်းသင့်ပါ။
- ၄။ ဆေးစတင်မဖျန်းမီ အသုံးပြုမည့် ဆေးဖျန်းကိရိယာ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ကောင်းမွန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပါ။
- ၅။ ဆေးဖျန်းပုံးအတွင်းသို့ ရေကို (၂/၃)ခန့်အထိ ရေစစ်ကောကို အသုံးပြု၍ ထည့်ပါ။
- ၆။ ဆေးရည်ထည့်ပြီးပါက ဆေးဖျန်းပုံး အပိတ်ကို တင်းကြပ်စွာ ပိတ်ပါ။
- ၇။ ဆေးဖျန်းခေါင်းနှင့် အပင်၏ အသင့်တော်ဆုံး အကွာအဝေးမှာ (၃၀) စင်တီမီတာ ဖြစ်သည်။ ဆေးစက်ပျံ့နှံ့မှု အကွာအဝေးမှာ (၄ • ၄ • ၅)ပေ အထိသာ ဖျန်းပါ။



- ၈။ ယာမြေတွင် လမ်းလျှောက်နှုန်းမှာ (၃)ပေ/စက္ကန့် နှုန်းဖြစ်၍ လယ်မြေများတွင်(၁၀ ၅)ပေ/တစ်စက္ကန့် နှုန်း ပုံမှန်လျှောက်ပါ။
- ၉။ ဆေးဖျန်းရာတွင်ဆေးဖျန်းခေါင်းကို လေအောက်ဖက်တွင် ထား၍ ဆေးဖျန်းပါ။
- ၁၀။ သီးနှံပင်များကို ဆေးဖျန်းရာတွင် သီးနှံဖြစ်ထွန်းချိန်တစ်လျှောက် တစ်တန်းခြင်း ဖျန်းပါ။



- ၁၁။ ဆေးဖျန်းစဉ်အတွင်း လေဖိအားလျော့နည်းသွားပါက ထွက်လာသောဆေးစက်၏ အရွယ်အစားပိုကြီးလာသည့်အတွက် အပင်များကို ထိခိုက်လောင်ကျွမ်းစေနိုင်သောကြောင့် လေဖိအားပုံမှန်အနေအထားအတိုင်းရှိစေရန် လေထပ်ဖြည့်ပေးပါ။

အသုံးပြုပြီးနောက် ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ

- ၁။ ဆေးဖျန်းပုံးအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ဆေးရည်များကို အောက်ခြေရှိ အပေါက်မှ ကုန်စင်အောင် ထုတ်ပေးရမည်။ ရေစီးနေသောချောင်း၊ မြောင်းအတွင်း စွန့်ထုတ်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။
- ၂။ ဆေးဖျန်းပုံးအဖုံးကို ခပ်ချောင်ချောင် ထားပေးရမည်။ ဆေးဖျန်းပုံးတစ်ခုလုံးရှိစွတ် စိုနေသောရေများကို အဝတ်စဖြင့် ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပေးပါ။
- ၃။ ဆေးဖျန်းခေါင်းတွင် ဆေးအကြွင်းအကျန်များ၊ အညစ်အကြေးများမရှိစေရန် အတွက်ဆေးကြောပါ။
- ၄။ ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးနောက် အသုံးမပြုမီအချိန်အတွင်း ကလေးများ၊ တိရစ္ဆာန်များ၊ အစားအစာများနှင့်ဝေးသောနေရာတွင် လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။

